



Actualités pour vous

Recommandations de la Société Suisse d'Infectiologie (SSI) en cas d'infections des voies urinaires¹

À l'ère de la résistance croissante aux antibiotiques, la Société Suisse d'Infectiologie recommande une **utilisation prudente des antibiotiques** en cas d'infections urinaires non compliquées:

Pour certaines patientes, des **approches réduisant l'utilisation des antibiotiques** peuvent être proposés en première intention:¹

- Pas d'antécédent de pyélonéphrite
- Durée des symptômes ≤ 5 jours

Bon à savoir:

Canephron® est mentionné dans différentes directives et avis d'experts



Europe

EAU Guideline Urological Infections 2025²

Association européenne d'urologie



Canephron

La directive de l'EAU classe le **niveau de preuve** pour l'utilisation de Canephron dans le soulagement des symptômes en cas de cystite aiguë comme étant **élevé**.



Allemagne

Directive S3 pour les IVU 2024³

Société allemande d'urologie



Canephron

Recommandation conforme aux directives, basée sur des preuves en cas de cystite aiguë non compliquée.

Niveau de preuve 1a



Suisse

Avis d'experts de la SSGO pour les IVU 2025⁴

Société Suisse de Gynécologie et d'Obstétrique



Canephron est recommandé pendant la phase aiguë d'une infection des voies urinaires.

hoch Health Ostschweiz

Suisse

hoch Health Ostschweiz Guideline pour les IVU 2025

Hôpital cantonal de Saint-Gall⁵, Hôpital d'Altstätten⁶, Hôpital de Grabs⁶, Hôpital de Linth⁷, Hôpital de Wil⁸

Canephron comme option thérapeutique en cas de cystite non compliquée.



Canephron® en bref

Canephron® – Médicament traditionnel pour le traitement d'infections urinaires non compliquées chez la femme^{9,*}



Triple association de plantes
à base de feuilles de romarin, de petite centaurée et de racine de livèche⁹



Prix départ fabrique
Recommandation de prix
sans engagement,
TVA incluse

CHF 17.95
CHF 26.80



Effet multiple¹⁰
antiphlogistique, spasmolytique,
analgésique / antinociceptif, antiadhésif



Emballage
30 comprimés enrobés



Soulage les symptômes typiques
d'IU non compliquées comparable
à la fosfomycine¹⁰



Médicament
Catégorie de remise D



Pour les adolescentes dès 12 ans
(sur ordonnance médicale)
et adultes⁹



Dosage 3 x 1⁹
à prendre avec du liquide



Durée de la prise 7¹⁰ à 10 jours
en général



Grossesse: pas de contre-indication
(que sur ordonnance médicale)⁹
Allaitement: ne pas utiliser⁹

Code pharma
7795891



* Utilisé traditionnellement comme traitement de soutien pour des cas de symptômes légers dans le cadre d'infections non compliquées des voies urinaires basses chez la femme après exclusion d'une maladie grave.

Canephron® (Médicament phytothérapeutique)

C: Petite centaurée, racine de livèche, feuilles de romarin. **I:** Symptômes légers dans le cadre d'infections non compliquées des voies urinaires basses chez la femme. **P:** Adolescents dès 12 ans (sur prescription) et adultes: 1 comprimé 3 fois par jour. **CI:** Hypersensibilité à l'un des composants du médicament, apicées ou anéthol, ulcère gastro-duodéal. **P:** Maladies urologiques graves, maladies concomitantes significatives. **IA:** Aucune connue. **G/A:** Grossesse: sur prescription médicale. Allaitement: ne pas utiliser. **EI:** Fréquents: nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales et autres symptômes gastro-intestinaux. Indéterminée: réactions d'hypersensibilité. **E:** 30 comprimés enrobés. **Cat. D.** Pour des informations détaillées, voir www.swissmedicinfo.ch. V021220

Références:

1 ssi.guidelines.ch/guideline/2981, consulté le 05.11.2025. | 2 EAU Guidelines on: Urological Infections (2025). www.uroweb.org, consulté le 05.11.2025. | 3 Deutsche Gesellschaft für Urologie e. V. S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei Erwachsenen (HWI). Registernummer: 043-044 (Aktualisierung 2024). www.awmf.org, consulté le 05.11.2025. | 4 Betschart C et al. SGGG Expertenbrief No 93 – Akute und rezidivierende Harnwegsinfektionen (Stand 2025). www.sggg.ch, consulté le 05.11.2025. | 5 kssg.guidelines.ch/guideline/579, consulté le 05.11.2025. | 6 srrws.guidelines.ch/guideline/579, consulté le 05.11.2025. | 7 linth.guidelines.ch/guideline/579, consulté le 05.11.2025. | 8 srft.guidelines.ch/guideline/579, consulté le 05.11.2025. | 9 Canephron. www.swissmedicinfo.ch, consulté le 05.11.2025. | 10 Wagenlehner FM et al. Non-Antibiotic Herbal Therapy (BNO 1045) versus Antibiotic Therapy (Fosfomycin Trometamol) for the Treatment of Acute Lower Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: A Double-Blind, Parallel-Group, Randomized, Multicentre, Non-Inferiority Phase III Trial. *Urol Int* 2018; 101(3): 327-336.

Les références sont disponibles sur demande.
Information destinée aux professionnels.