

TRAUMATISME DE LA COLONNE DORSO-LOMBAIRE

Identité

Etiquette patient

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| <input type="radio"/> ♂ | <input type="radio"/> profession | |
| <input type="radio"/> ♀ | <input type="radio"/> sportif prof | |
| <input type="radio"/> ado | <input type="radio"/> sportif amateur | |
| <input type="radio"/> enft | <input type="radio"/> date accident | h |
| <input type="radio"/> âge: | <input type="radio"/> date 1 ^{re} consultation | h |
| <input type="radio"/> droitier | <input type="checkbox"/> date autre consultation | h |
| <input type="radio"/> gaucher | | |

Dr

- ### Antécédents généraux (maladies osseuses, neurologiques, musculaires; anticoagulation, crase sanguine; tumeur, diabète, allergie, alcool, médicaments)

- ### Antécédents locaux (anciens traumatismes, autres pathologies, hernie discale, troubles statiques)

Circonstances

- Voie publique
- Professionnel
- Domestique
- Jeu
- Sport
- Malaise
- Agression
- Autre

Mécanisme

- Energie** basse moyenne haute
- Choc** direct indirect axial chute sur les pieds sur les fesses
- projection sur la tête
 - flex.- projection en avant avec ceinture de sécurité
 - ext. rotation
 - incl. latérale G D


Symptômes

- Douleurs** discrète modérée intense diffuse
 localisée à:
- Impotence** partielle totale
- Autres symptômes** paralysie parésies paresthésies autre

Status

- Colonne cervicale** intégrité pathologique
- Bassin** intégrité pathologique
- Examen interne** : sp présence de bradycardie hypotension iléus incontinence
- Peau** sp plaie localisée à :
- Position** sp fl. ext. incl. lat. D G
- Motricité** sp déficit de: fl. ext. rot D rot. G
 incl. lat. D incl. lat. G
 élévation des côtes abaissement des côtes
 insp. exp.
 abduction du 5° doigt (D1)
 fl. hanche (L1-L2) ext. genou (L3)
 extension cheville.(L4)
 ext. gros orteil (L5)
 fl. cheville-évers. cheville-ext. hanche-ext genou (S1)
 fl. genou (S2)

Sensibilité



- sp déficit

- Réflexes** sp
 déficit: rotulien (L3)
 achilléen (L5)
- Mobilisation** distance doigt-sol cm
 ext.-fl. (30/0/60)
 rot. (40/0/40)
 incl. lat. (35/0/35)
- Palpation osseuse douloureuse**
 non oui localisé à:
 dorsale (D1 à D12): D...
 lombaire (L1 à L5): L...
- Lasègue** neg pos D:° G:°
- Contracture musculaire**
 absence discrète modérée
 forte localisée à:

Radiographies

- colonne dorsale face profil ¾ colonne lombaire face profil ¾
 scanner IRM autre
-

Diagnostic

- fracture luxation entorse grave contusion
 entorse banale troubles neuro.
-

Traitement

- fonctionnel** réduction extension
 alitement immobilisation plâtre corset
 anticoagulation
 médicaments :

chirurgical

- incapacité de travail** % durée : du au