

TRAUMATISME DE L'AVANT-PIED

droit gauche

Identité

Etiquette patient

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| <input type="radio"/> ♂ | <input type="radio"/> profession | |
| <input type="radio"/> ♀ | <input type="radio"/> sportif prof | |
| <input type="radio"/> ado | <input type="radio"/> sportif amateur | |
| <input type="radio"/> enft | <input type="radio"/> date accident | h |
| <input type="radio"/> âge: | <input type="radio"/> date 1 ^{re} consultation | h |
| <input type="radio"/> droitier | <input type="checkbox"/> date autre consultation | h |
| <input type="radio"/> gaucher | | |

Dr

- ### Antécédents généraux (maladies osseuses, neurologiques, musculaires ; anticoagulation, crase sanguine ; tumeur, diabète, allergie, alcool, médicaments)

- ### Antécédents locaux (anciens traumatismes, autres pathologies, hernie discale, troubles statiques)

- pied égyptien pied grec pied plat pied creux autre
 troubles dégénératifs affaissement arche antérieure hallux valgus
 orteil en marteau autre:

Circonstances

- Voie publique
 Professionnel
 Domestique
 Jeu
 Sport
 Malaise
 Agression
 Autre

Mécanisme

- Energie** basse moyenne haute
 Choc direct indirect axial inversion éversion flexion plantaire
 extension plantaire abd add pronation supination
 rotation interne rotation externe

Symptômes

- Douleurs** discrète modérée intense diffuse
 localisée à:
- Impotence** partielle totale
- Autres symptômes** craquement impression de luxation déchirure

 Status

- Articulation de la cheville** sp pathologique
- Déformation** non oui
- Tuméfaction** non oui diffuse localisée à:
- Peau** sp plaie localisée à:
 hématome localisé à:
- Ongle** sp fracturé avulsé hématome sous unguéal
- Lit de l'ongle** sp fracturé avulsé
- Artère pédieuse** palpable non palpable
- Artère tibiale post.** palp. non palp.
 pouls capillaire < 2 sec. > 2 sec
- Sensibilité** sp déficit localisé à:
- Mobilité**
- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> active | <input type="checkbox"/> inv. – év. chev. (45/0/25) | <input type="checkbox"/> passive | <input type="checkbox"/> inv. – év. chev. |
| <input type="checkbox"/> MP flex.pl. ext. (25/0/45) | <input type="radio"/> I <input type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV <input type="radio"/> V | | |
| <input type="checkbox"/> IPP flex.pl. ext. (45/0) | <input type="radio"/> I <input type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV <input type="radio"/> V | | |
| <input type="checkbox"/> IPD flex.pl. ext. (45/0) | <input type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV <input type="radio"/> V | | |
- Palpation osseuse douloureuse** non oui
- scaphoïde cuboïde 1er cunéiforme 2^e cunéiforme 3^e cunéiforme
- I^{er} métatarsien base diaph. tête ort I P1 P2
- II^e métatarsien base diaph. tête ort II P1 P2 P3
- III^e métatarsien base diaph tête ort III P1 P2 P3
- IV^e métatarsien base diaph. tête ort IV P1 P2 P3
- V^e métatarsien base diaph. tête ort V P1 P2 P3
- Palpation articulaire douloureuse** non oui
- Lisfranc I-II II-III III-IV IV-V
- MP I II III IV V
- IP I IPP II IPP III IPP IV IPP V IPD II III IV V
- Laxité** absence présence
- Lisfranc
- MP I II III IV V
- IPP ort. I ort. II ort. III ort. IV ort. V
- Mobilité contrariée**
- extension orteils (tendons extenseurs orteils) sp déficit
- flexion orteils (tendons fléchisseurs orteils) sp déficit

Radiographies

- avant-pied face avant-pied oblique avant-pied profil
- orteil face orteil oblique sésamoïde cheville face cheville profil
- scanner IRM
- autre:

Diagnostic

- fracture luxation entorse lésion tendineuse autre:

Traitement

conservateur

- réduction
- contention attelle circulaire
- type: durée:
- charge décharge
- anti-coagulation:
- médicaments:

chirurgical

- incapacité de travail** % durée: du au