

TRAUMATISME D'UNE DIAPHYSE

humérus avant-bras fémur jambe

Identité

Etiquette patient

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| <input type="radio"/> ♂ | <input type="radio"/> profession | |
| <input type="radio"/> ♀ | <input type="radio"/> sportif prof | |
| <input type="radio"/> ado | <input type="radio"/> sportif amateur | |
| <input type="radio"/> enft | <input type="radio"/> date accident | h |
| <input type="radio"/> âge : | <input type="radio"/> date 1 ^{re} consultation | h |
| <input type="radio"/> droitier | <input type="checkbox"/> date autre consultation | h |
| <input type="radio"/> gaucher | | |

Dr

Antécédents généraux (maladies osseuses, neurologiques, musculaires ; anticoagulation, crase sanguine ; tumeur, diabète, allergie, alcool, médicaments)

Antécédents locaux (anciens traumatismes, autres pathologies, troubles statiques)

Circonstances

- Voie publique
- Professionnel
- Domestique
- Jeu
- Sport
- Malaise
- Agression
- Autre

Mécanisme

- Energie** basse moyenne haute
- Choc** direct indirect axial flexion extension
 abd. add. rot. int. rot. ext.

Symptômes

- Douleur** discrète modérée intense diffuse
 localisée à :
- Impotence** partielle totale
- Autres symptômes** craquement claquement

Status

- articulation sus-jacente** (épanchement, mobilisation, palpation)
 - sp pathologique
 - articulation sous-jacente** (épanchement, mobilisation, palpation)
 - sp pathologique
 - Déformation** absence raccourcissement angulation en valgus
 - en varus en antecurvatum en recurvatum en rotation
 - interne externe
 - Tuméfaction** absence diffuse circonférence
 - cm + cm controlatéral localisée à:
 - Peau** sp plaie localisée à:
 - hématome localisé à:
 - Artère proximale** palpable non palpable
 - Artère distale** palpable non palpable
 - Sensibilité** sp déficit:
 - Palpation osseuse** indolore douloureuse localisée à:
 - Mobilisation** indolore douloureuse
 - en valgus en varus en antecurvatum en recurvatum
 - en rot. int. en rot. ext. en pression axiale
 - Palpation musculaire** sp loge souple tendue
 - mesure manométrique: mmHg
 - solution de continuité non oui
 - Force de contraction** sp diminuée
-

 Radiographies (avec articulations sus et sous jacentes)

- face profil oblique articulation sus-jacente articulation sous-jacente
 - scanner IRM autre:
-

 Diagnostic

- fracture fermée ouverte déplacée non déplacée
 - syndrome de loge contusion
-

 Traitement

- conservateur** réduction
 - contention attelle circulaire articulation immobilisée
 - type: durée:
 - anti-coagulation:
 - médicaments:
- chirurgical**
- incapacité de travail** % durée: du au