

TRAUMATISME SCAPULO-THORACIQUE

droit gauche

Identité

Etiquette patient

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| <input type="radio"/> ♂ | <input type="radio"/> profession | |
| <input type="radio"/> ♀ | <input type="radio"/> sportif prof | |
| <input type="radio"/> ado | <input type="radio"/> sportif amateur | |
| <input type="radio"/> enft | <input type="radio"/> date accident | h |
| <input type="radio"/> âge: | <input type="radio"/> date 1 ^{re} consultation | h |
| <input type="radio"/> droitier | <input type="checkbox"/> date autre consultation | h |
| <input type="radio"/> gaucher | | |

Dr

- ## Antécédents généraux
- (maladies osseuses, neurologiques, musculaires ; anticoagulation, crase sanguine ; tumeur, diabète, allergie, alcool, médicaments)

- ## Antécédents locaux
- (anciens traumatismes, autres pathologies, hernie discale, troubles statiques)

Circonstances

- Voie publique
- Professionnel
- Domestique
- Jeu
- Sport
- Malaise
- Agression
- Autre

Mécanisme

- Energie** basse moyenne haute
- Choc** direct sterno-claviculaire claviculaire épaule omoplate
 indirect axial sur moignon de l'épaule sur coude sur main
 abd. add. rot. int. rot. ext. flex. ext.

Symptômes

- Douleur** discrète modérée intense diffuse
 localisée à ant. C4 C5 post. bras
- Impotence** partielle totale
- Autres symptômes** déboîtement « bras mort » craquement
 claquement déchirure

Status

- Colonne cervicale** intégrité pathologique
- Coude** intégrité pathologique
- Thorax** auscultation cardiaque sp pathologique
 auscultation pulmonaire sp pathologique
 palpation des côtes sp douleur localisée à
- Position MS** normale tenu par l'autre bras en abd.
 en rot. int. inclinaison de la tête
- Déformation** absence dépression/saillie st.-clav. 1/3 moyen clav.
 touche de piano acr.-clav coup de hache deltoïdien
 crosse tuméfaction post. décollement omoplate
- Peau** plaie localisée à: menace perforation
 hématome localisé à:
- Artère humérale** palpable non palpable
- Artère radiale** palp. non palp. **pouls capillaire** < 2 sec > 2 sec.
- Nerf médian** (sensibilité pulpe index/opposition du pouce) sp déficit
- Nerf. radial** (sensibilité dorsale 1^{re} commissure/extension poignet) sp déficit
- Nerf. ulnaire** (sensibilité face externe 5^e doigt/écartement 5^e doigt) sp déficit
- Nerf circonflexe** (sensibilité latérale moignon épaule/contraction deltoïde)
 sp déficit
- Nerf. sus-scapulaire** (parésies sus et sous épineux) sp déficit
- Nerf long thoracique** (appui des mains contre parois)
 pas de décollement décollement
- Nerf. accessoire** omoplate pas éloignée
 omoplate éloignée de la ligne des épineuses
- Mobilité**
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> active | <input type="checkbox"/> passive |
| <input type="checkbox"/> flex/ext. (150-170/0/40) | <input type="checkbox"/> flex/ext. |
| <input type="checkbox"/> add./abd.
(20-40/0/160-180) | <input type="checkbox"/> add./abd. |
| <input type="checkbox"/> rot. ext., coude au corps
(-90/0/70) | <input type="checkbox"/> rot. ext., coude au corps |
| <input type="checkbox"/> rot.int./ext., coude à 90° d' abd.
(90/0/70-90) | <input type="checkbox"/> rot.int./ext.,
coude à 90° abd. |
| <input type="checkbox"/> rot.int.touche: <input type="radio"/> gd trochanter <input type="radio"/> fesse <input type="radio"/> colonne D L | |
- Palpation osseuse douloureuse** non oui
 st. clav. clav. acr.- clav. acromion coracoïde tête humérale
 trochiter trochin humérus corps omoplate.

Mobilisation contrariée

- coiffe des rot. freinage du bras de 90° d'abd à 0° possible impossible
 tend. m. sus-épineux. abd doul déficit Jobe pos neg
 tend. m sous-épineux rot. ext. doul déficit Patte pos neg
 s.portillon pos neg s. clairon pos neg
 tend m. sous-scapulaire rot. Int. doul. déficit Gerber pos neg
 Belly press test pos neg
 tend. m. biceps fl.- sup doul déficit. Gilcreest pos neg
 tend. m. dentelé. ant. décollement omoplate par appui contre une paroi
 pos neg

- Laxité** tiroir ant. abs. prés. tiroir post. abs. prés.
 signe du sillon abs. prés.
 test d'appréhension abd/rot. ext. pos neg
 test d'appréhension abd/rot. int pos neg

 Radiographies

- face face rot. int. face rot. ext. axial Neer transth. omoplate
 acromio-clav. thorax scanner IRM arthroscanner arthro IRM

 Diagnostic

- luxation fracture rupture tend. aff. neuro. contusion/sidération autre

 Traitement

- conservateur** réduction
 gilet brassard durée:
 médicaments:

 chirurgical

- incapacité de travail** % durée: du au