

TRAUMATISME DE LA FACE

Identité

Etiquette patient

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| <input type="radio"/> ♂ | <input type="radio"/> profession | |
| <input type="radio"/> ♀ | <input type="radio"/> sportif prof | |
| <input type="radio"/> ado | <input type="radio"/> sportif amateur | |
| <input type="radio"/> enft | <input type="radio"/> date accident | h |
| <input type="radio"/> âge: | <input type="radio"/> date 1 ^{re} consultation | h |
| <input type="radio"/> droitier | <input type="checkbox"/> date autre consultation | h |
| <input type="radio"/> gaucher | | |

Dr

- ### Antécédents généraux
- (maladies osseuses, neurologiques, musculaires ; anticoagulation, crase sanguine ; tumeur, diabète, allergie, alcool, médicaments)

- ### Antécédents locaux
- (anciens traumatismes, rhinosinusite, trouble oculaire, dentaire, autres pathologies)

Circonstances

- Voie publique
- Professionnel
- Domestique
- Jeu
- Sport
- Malaise
- Agression
- Autre

Mécanisme

- Energie** basse moyenne haute
- Choc** 1/3 sup 1/3 moy. central pommette lat. D G
- 1/3 inf. menton lat. D G
- mâchoire inf. D G

Symptômes

- Douleurs** sp discrète modérée intense diffuse
- localisée à:
- Autres symptômes** altération de la conscience difficulté respiratoire
- trouble déglutition épistaxis trouble oculaire

Status **Etat général**

- voies respiratoires libres obstruées
 respiration sp altérée
 état de conscience sp altéré
 état hémodynamique sp altéré

 Inspection

- Déformation : aucune en ballon de rugby
 nez en selle déviation nasale D G
 bouche ouverte béance dentaire
 déviation de la mâchoire D G
 asymétrie orbito-nasale
 Tuméfaction : aucune
 1/3 sup localisé à
 1/3 moyen localisé à
 1/3 inférieur localisé à

 Epistaxis

- oui non

 Plaies

- absence localisé à

 Hématome

- absence localisée à
 en monocle en lunettes de la cloison nasale

 Orifices

- Nez libre sang liquide céphalorachidien autre
 Bouche libre sang autre
 Oreille D libre sang autre
 Oreille G libre sang autre

 Œil

- enophtalmie absence présence D G
 exophtalmie absence présence D G
 emphysème ss cut des paupières
 absence présence D G
 mouvement des paupières sp défaut D G
 vision sp dipopie déficit D G
 hyphéma absence présence D G
 hémorragie conjonctivale
 absence présence D G
 motricité oculaire sp déficit D G
 réaction pupillaire sp déficit D G
 fond d'œil sp anomalie D G

 Sensibilité

- sp déficit V1 V2 V3

 Mimique

- sp déficit localisée à

 Occlusion dentaire

- sp déficit diduction
 fracture dentaire non oui n°...
 luxation dentaire non oui n°...
 enfoncement dentaire non oui n°...

- Palpation osseuse** sp douloureuse frontale glabellle D G
 arcade sourcilière D G
 rebord orbitaire D lat int inf
 G lat int inf
 pommette D G zygomatique D G
 arc alvéolodentaire D med G menton
 branche montante D G
 angle mandibulaire D G
 articulation temporo-mandibulaire D G
- solution de continuité non oui localisée à
- fausse mobilité non oui localisée à
-

Radiographies

- crâne face crâne profil menton – nez – plaque Hirtz Worms
 orthopantomogramme scanner IRM autre
-

Diagnostic

- fracture luxation contusion lésion neurologique plaie autre
-

Traitement

- fonctionnel** réduction
 méchage nasal
 médicaments:
- chirurgical** suture
 intervention spécialiste
- incapacité de travail** % durée: du au