

## TRAUMATISME D'UNE DIAPHYSE

humérus  avant-bras  fémur  jambe

### Identité

Étiquette patient

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <input type="radio"/> ♂        | <input type="radio"/> profession                        |   |
| <input type="radio"/> ♀        | <input type="radio"/> sportif prof                      |   |
| <input type="radio"/> ado      | <input type="radio"/> sportif amateur                   |   |
| <input type="radio"/> enft     | <input type="radio"/> date accident                     | h |
| <input type="radio"/> âge:     | <input type="radio"/> date 1 <sup>re</sup> consultation | h |
| <input type="radio"/> droitier | <input type="checkbox"/> date autre consultation        | h |
| <input type="radio"/> gaucher  |   |   |

Dr

**Antécédents généraux** (maladies osseuses, neurologiques, musculaires; anticoagulation, crase sanguine; tumeur, diabète, allergie, alcool, médicaments)

**Antécédents locaux** (anciens traumatismes, autres pathologies, troubles statiques)

### Circonstances

- Voie publique
- Professionnel
- Domestique
- Jeu
- Sport
- Malaise
- Agression
- Autre

### Mécanisme

- Energie**  basse  moyenne  haute
- Choc**  direct  indirect  axial  flexion  extension  
 abd.  add.  rot. int.  rot. ext.

### Symptômes

- Douleur**  discrète  modérée  intense  diffuse  
 localisée à:
- Impotence**  partielle  totale
- Autres symptômes**  craquement  claquement

**Status**

- articulation sus-jacente** (épanchement, mobilisation, palpation)
    - sp  pathologique
  - articulation sous-jacente** (épanchement, mobilisation, palpation)
    - sp  pathologique
  - Déformation**  absence  raccourcissement  angulation  en valgus
    - en varus  en antecurvatum  en recurvatum  en rotation
    - interne  externe
  - Tuméfaction**  absence  diffuse  circonférence
    - cm  + cm controlatéral  localisée à:
  - Peau**  sp  plaie localisée à:
    - hématome localisé à:
  - Artère proximale**  palpable  non palpable
  - Artère distale**  palpable  non palpable
  - Sensibilité**  sp  déficit:
  - Palpation osseuse**  indolore  douloureuse localisée à:
  - Mobilisation**  indolore  douloureuse
    - en valgus  en varus  en antecurvatum  en recurvatum
    - en rot. int.  en rot. ext.  en pression axiale
  - Palpation musculaire**  sp  loge  souple  tendue
    - mesure manométrique: mmHg
    - solution de continuité  non  oui
  - Force de contraction**  sp  diminuée
- 

 **Radiographies** (avec articulations sus et sous jacentes)

- face  profil  oblique  articulation sus-jacente  articulation sous-jacente
  - scanner  IRM  autre:
- 

 **Diagnostic**

- fracture  fermée  ouverte  déplacée  non déplacée
  - syndrome de loge  contusion
- 

 **Traitement**

- conservateur**  réduction
  - contention  attelle  circulaire articulation immobilisée
  - type:  durée:
  - anti-coagulation:
  - médicaments:
- chirurgical**
- incapacité de travail** % durée: du au